


Processo produttivo della “moleca”

La produzione delle moleche può essere considerata una attività intermedia tra pesca ed allevamento poiché inizia con una vera e propria attività di raccolta dei granchi mediante appositi sistemi di cattura ma nella seconda fase i crostacei vengono mantenuti vivi in apposite gabbie fino alla muta, attività che è più caratteristica delle forme di zootecnica acquatica.

Il processo nel suo complesso può essere segmentato nelle fasi di seguito descritte.

Pesca dei granchi

La raccolta dei granchi veniva effettuata fino agli anni '60-'70 prioritariamente con la pesca a strascico all'interno della laguna; fino alla motorizzazione delle imbarcazioni la rete veniva trascinata da una unica imbarcazione a vela messa di traverso, successivamente , con l'avvento del motore, da due imbarcazioni che trainavano la rete ed erano in grado di esprimere un potere di cattura nettamente superiore.



In passato la pesca a strascico del granchio veniva fatta in corrispondenza dei due picchi di produzione delle moleche (marzo-aprile e ottobre-novembre) con una rete appositamente modificata per tale tipo di cattura e chiamata per tale ragione “granzero”.

Le reti fisse ad oggi sono il principale metodo di cattura dei granchi, essi sono costituiti da pannelli di rete (trezze) fissati perpendicolarmente al fondo per mezzo di pali conficcati nel terreno e che convogliano i granchi ed altre specie ittiche della comunità bentonica lagunare verso i sistemi di cattura veri e propri detti “cogoi o cogoli”.



I “cogoli”, analoghi nel funzionamento alle più famose “nasse” sono costituiti ciascuno da un cilindro di rete con un sistema di non ritorno posto all’ingresso.

Di solito le “trezze” vengono disposte a 45° rispetto al moto di corrente, vicino a zone di acque più profonde e ricche di fanerogame marine. Col crescere della marea i granchi si spostano sulle alture dove sono collocate le reti ed ivi vengono catturati.

Una volta al giorno (di solito la mattina presto) i cogoli vengono svuotati del loro contenuto che viene selezionato, e le varie specie prendono destinazioni diverse: anguille, go, latterini, cefali, ecc..al mercato del pesce ed i granchi al vaglio per separare i granchi destinati alla produzione delle moleche.

moèche

Scritto da Damiano Savin

